

《説明書》 この説明書をよくお読みになり接種してください。

▶風しんとは？

風しんウイルスが原因で発熱と発疹を引き起こし、風しんへの抗体（抵抗力）のない人が感染した場合、5～7人にうつすと言われる強い感染力のある感染症です。

風しんは妊娠初期に感染すると、胎児に先天性風しん症候群（心臓疾患、難聴、白内障）という障がいをもたらします。平成24年～平成25年の流行では全国で16,730人が発症し、45名の先天性風しん症候群のお子さんが生まれました。

▶予防接種の効果

風しんの予防には予防接種がもっとも有効な方法であり、予防接種を受けることで95%以上の方が風しんウイルスに対する免疫がつくといわれています。抗体価の上昇は自然罹患よりは低いですが、20年近く抗体が持続し、自然感染による発症を防ぎます。

▶予防接種を受ける前に

- ・この定期接種は、予防接種法に基づく予防接種です。
- ・風しんの抗体検査を受けた結果、風しんの抗体価が基準より低い場合には予防接種の定期接種の対象となります。
- ・以下の内容をお読みいただき、合わせて厚生労働省のホームページ等の情報から予防接種の有効性、起こりうる副作用についてご確認ください。

【下記に該当する方は接種を行ってはいけません】

- ① 接種当日、明らかな発熱を呈している方
- ② 重篤な急性疾患にかかっている方
- ③ 風しんのワクチン、MR（麻しん・風しん）混合ワクチンによってアナフィラキシー様反応を呈したことがある方
- ④ 風しんに係る抗体検査を受けた結果、基準を超える抗体価が認められる方
- ⑤ その他、予防接種を行うことが不適切な状態にある方

【予防接種を受けるに際し、注意が必要である方】

- ① 心臓血管系、腎疾患、肝臓疾患、血液疾患等の基礎疾患を有する方
- ② 予防接種で接種後2日以内に発熱の見られた方、及び全身性発疹等のアレルギーを疑う症状を呈したことがある方
- ③ 過去にけいれんの既往のある方
- ④ 過去に免疫不全の診断がされている方及び近親者に先天性免疫不全症の方がいる方
- ⑤ このワクチンの成分にアレルギー反応を起こす恐れがある方

▶予防接種を受けた後の注意点

- ① 予防接種を受けた後、急な副反応が30分以内に起こることがあります。医師（医療機関）とすぐに連絡が取れるようにしておきましょう。
- ② 接種当日は激しい運動は避けてください。
- ③ 接種当日の入浴は差し支えありませんが、接種したところをこすらないでください。
- ④ 接種後は健康状態を観察し、高熱や体調の変化、局所の異常等に気がついた場合はただちに医師の診察を受けてください

▶予防接種の副反応

発疹・発熱等が多い副反応です。その他には、注射部位の発赤・腫脹、硬結などの局所反応、じんましん、リンパ節腫脹、関節炎、倦怠感があります。重大な副反応としてごくまれに、ショック、アナフィラキシー血小板減少性紫斑症、脳炎・脳症、けいれんが起こる場合があります。

▶医療機関について

- ・職場での健康診断等で受診される場合は、所属先に直接お問い合わせください。
- ・予防接種は、本事業に参加している全国の医療機関等で受けられます。
- ・抗体検査・予防接種をうけられる医療機関等のリストは、厚生労働省 HP にてご確認ください。

厚生労働省 QR コード



▶清須市内医療機関（抗体検査・予防接種可能）

- ・本事業に参加している医療機関は随時変更いたします。
- ・必ず事前に医療機関に電話で予約をし、受診してください。

	医療機関名	電話		医療機関名	電話
西枇杷島	石原医院	501-5131	新川	三輪医院	400-2057
	遠藤外科・整形外科	502-8841		きよすクリニック	409-8585
	尾関医院	501-5121		きとう医院	400-7211
	山田医院	502-8617	春日	丹羽医院	400-3163
	はなさきクリニック	503-4159		溝口クリニック	409-0777
	堀田クリニック	502-4435		ゆたかクリニック	408-0171
清洲	水田医院	387-8618	はるひ呼吸器病院	400-7111	
	まへの内科クリニック	401-2600	五条川リハビリテーション病院	401-7272	
	すずきホームクリニック	409-3800			
	ゆうあいリハビリクリニック	401-1611			
	このはなファミリークリニック	325-7596			

【お問合せ先】
清須市 健康福祉部 健康推進課
TEL 052-400-2911（代表）